LOCOMOÇÃO

Grupo: Fábio Pais

Fábio Santana

Lucas Silveira

Tathiane da Silva

Disciplina: Ecofisiologia de organismos Nectônicos

Introdução:

- Tipos de esqueleto e suas estruturas;
- Tipos de músculos e funcionamento;
- Modos de locomoção animal.

Esqueletos

A estrutura dos esqueletos dá suporte e estabilidade ao movimento dos animais.

Existem 3 tipos de esqueletos:

- ❖ Esqueleto Hidrostático
- ❖ Exoesqueleto
- ❖ Endoesqueleto

❖ Esqueleto Hidrostático

- Invertebrados de corpo mole (ex: minhocas e águas vivas)
- Cavidades preenchidas por fluidos e envoltas por músculos

Exemplo da minhoca

Uma onda de contrações dos músculos circulares anteriores começa e comprime cada segmento do corpo, com isso a pressão do fluido puxa a minhoca para frente

❖ Exoesqueleto

Prós:

- Ocorre em Artrópodes (crustáceos e insetos por exemplo)
- Reveste o corpo
- Composto por Polissacarídeo quitinoso
- É muito resistente e dá uma grande proteção aos órgãos internos

❖ Exoesqueleto

Contras:

- Deixa o animal vulnerável a predadores durante o período de ecdise.
- Limita o tamanho do animal.

Imagem da ecdise de uma cigarra

❖ Endoesqueleto

- É encontrado em vertebrados e equinodermos
- Seus ossos são internos e rígidos
- Dá suporte ao corpo, que, nos vertebrados, tem um exterior flexível e que se acomoda aos movimentos do esqueleto
- Seus ossos são aonde os músculos se atrelam
- Nos vertebrados, é composto por ossos e cartilagens, e são classificados em **Axial** e **Apendicular**.

■ Endoesqueleto Axial

- Se encontra na parte centro-vertical do corpo
- Seus ossos dão sustentabilidade ao corpo e protegem os órgãos da cabeça, pescoço e peito

■ Endoesqueleto Apendicular

- Se encontra nas extremidades do corpo
- Alguns de seus ossos são conectados a alguns dos ossos do endoesqueleto axial
- E suas juntas são móveis

Em vertebrados, como esse gato, tem Endoesqueleto. A parte Axial esta colorido de rosa (indicado na figura estão: o Crânio, as Costelas e a Coluna Vertebral) e a parte Apendicular esta colorido de amarelo (indicado na figura estão os maiores ossos, são eles: a Escápula, o Humerus, a Ulna, o Rádio, a Pévis, o Fêmur, a Tíbia e a Femula)

Estrutura dos ossos

- Ossos são os principais materiais que compõem o esqueleto dos vertebrados
- São compostos por células e uma matriz extracelular que contem colágeno (dá certa flexibilidade) e fosfato de cálcio (em forma de cristais de hidroxapatita, que dá resistência e dureza)
- São tecidos vivos, dinâmicos e que estão em constante reformulação (crescem e remodelam-se) durante a vida de um indivíduo
- São constituídos por camadas concêntricas e finas que descem pelos canais Harvesianos
- E nas extremidades e no interior de ossos longos encontra-se o osso esponjoso

Organização do osso em três níveis de detalhe. Algumas partes são compactas e densas, dando dureza e resistência ao osso. Outras partes são esponjosas, aonde se encontra a medula óssea, aonde a maioria das células sanguíneas são formadas

Juntas (Articulações)

Juntas, ou articulações, são os locais aonde um osso encontra o outro, ou seja, são os locais que conferem flexibilidade ao esqueleto rígido, permitindo determinados movimentos dependendo do tipo de junta. Existem três tipos:

- ❖ Juntas Imóveis
- ❖ Juntas Pouco Móveis
- ❖ Juntas Totalmente Móveis

❖ Juntas Imóveis

São as suturas que juntam os ossos do crânio, ou seja, são os locais que antes de ser se desenvolver eram *fontanelas* e mais tarde foram preenchidos por ossos.

❖ Juntas Pouco Móveis

- São as juntas aonde os ossos são intercalados por cartilagem
- Cartilagem que permite algum movimento e serve para amortecer choque

(b) Slightly movable joints

As juntas da coluna vertebral são pouco móveis, e entre as vértebras se encontram os discos intervertebral, formados de cartilagem.

❖ Juntas Totalmente Móveis (ou Sinoviais)

- Incluem vários tipos de juntas
- As extremidades dos ossos são niveladas com cartilagem e cápsulas sinoviais que são reforçadas por ligamentos (tais cápsulas sinoviais contem fluido lubrificante)
- E permitem movimentos ditados pela estrutura da junta

❖ Juntas Totalmente Móveis (ou Sinoviais)

A junta do dedo só permite um movimento de abre-e-fecha

Enquanto a junta entre o Fêmur e a Pélvis tem uma estrutura de bola-e-cavidade, que permite uma variedade de movimentos

Ações dos músculos esqueléticos

- Produzem o movimento do esqueleto: contração e relaxamento.
- São inseridos aos diferentes tipos de osso (ou outros órgãos, por exemplo a pele) por meio de um espesso tecido conjuntivo com propriedades elásticas: os tendões.

❖ Tipos de músculos esqueléticos

- Músculos sinérgicos: trabalham juntos para a realização de uma mesma ação na articulação
- Músculos antagônicos: músculos que flexionam uma articulação são antagônicos aos músculos que estendem a mesma articulação.

Exemplos dos tipos de músculos

❖ Tipos de contrações

- **Contrações isotônicas:** contração do músculo que envolve encurtamento, enquanto, o mesmo exerce uma força constante que corresponde à carga que está sendo erguida pelo músculo, assim, o músculo produz uma força igual ou superior a força oposta (levantamento de peso - gravidade).
- **Contrações isométricas:** inicia uma contração, porém, a mesma é absorvida pelos tendões e outros tecidos elásticos. O músculo não muda de tamanho. Essa contração sempre ocorre (provoca tensão e estabilidade para o corpo).

Mecanismo de contração dos filamentos delgados

- Cada músculo esquelético possui inúmeras fibras musculares.
- Cada fibra muscular anexa de 4 a 20 estruturas alongadas (miofibrilas).
- Cada miofibrila é composta por miofilamentos grossos e finos.

Estrutura muscular

❖ Estrutura interna das miofibrilas

- As miofibrilas são estriadas com bandas claras e escuras (bandas desenhadas por miofilamentos e miofibrilas).
- Os miofilamentos grossos e finos são empilhados para formação da banda escura (banda A).
- Os miofilamentos finos produzem a banda clara (banda I). Cada banda I é dividida ao meio por uma proteína (linha Z). Duas linhas Z delimitam uma região que é chamada de sârcômero.
- A banda H é constituída somente por filamentos grossos.

❖ O mecanismo de contração

O mecanismo de contração dos filamentos delgados consiste na contração e encurtamento das miofibrilas, porém, os miofilamentos não se encurtam, na verdade são os filamentos finos que deslizam para dentro da banda A. E isto faz com que a banda H fique estreita e as linhas Z se aproximam uma da outra (diminuição do sarcômero).

1 – Músculo relaxado.

2 – Músculo parcialmente contraído.

Ilustração

1 – Músculo relaxado.

2 – Músculo parcialmente contraído.

❖ “Cross-bridge”

- Mecanismo de deslizamento dos miofilamentos.
- Os filamentos grossos são compostos por vários pacotes de proteína **miosina**. E toda molécula de miosina possui uma região que se projeta (“cabeça”). Essa região forma o “cross-bridge” (contato do filamento grosso com o fino).

Estrutura molecular da miosina.

❖ “Cross-bridge”

- Os filamentos finos são compostos por várias proteínas globulares de **actina** em cadeia, compondo uma dupla hélice.

Estrutura molecular do filamento fino – cadeia de actina.

❖ “Cross-bridge”

- Antes da “cabeça” da miosina se ligar ao filamento fino, ela age como uma enzima ATPase, quebrando ATP em ADP + P (fosfato). Isto ativa a miosina e faz com que ela se ligue a actina, formando o “cross-bridge”.

Ciclo de contração pelo “cross-bridge”.

❖ “Cross-bridge”

- O processo de ligação entre a molécula de miosina e actina faz com que as “cabeças” da miosina se inclinem e criem um movimento dos filamentos finos em direção ao centro do sarcômero, seguido da liberação do ADP + P formado inicialmente.
- Enquanto o movimento continua a acontecer outro ATP pode se ligar à miosina e assim manter o ciclo do “cross-bridge” durante a contração.
- A partir do momento em que um ATP entra na “cabeça” da miosina e não é quebrado em ADP + P o “cross-bridge” cessa.
- Em caso de morte a produção de ATP cessa e “cross-bridge” não se desfaz, provocando uma tensão dos músculos. Entretanto, é bom lembrar que uma célula viva é sempre capaz de produzir ATP

❖ “Cross-bridge”

(a) Início do “cross-bridge”.

(b) Contração muscular – nível molecular.

O controle da contração muscular

- ❖ A regulação do cálcio
- ❖ A contração estimulada por nervos
- ❖ O recrutamento e as unidades motoras

❖ A regulação do cálcio

Papel de complexos de proteínas associadas com o cálcio:

- Bloqueio das actinas
 - Baixas concentrações – quase nula
- Desbloqueio das actinas
 - Altas concentrações

❖ A regulação do cálcio

- Bloqueio das actinas

❖ A regulação do cálcio

- Desbloqueio das actinas

❖ A regulação do cálcio

Origem do cálcio para essa regulação:

- Reticulo endoplasmático das fibras musculares

Reticulo Sarcoplasmático (Sarcoplasmic reticulum ou SR)

❖ A contração estimulada por nervos

Músculos são estimulados a contrair por neurônios motores, chamados de neurônios motores somáticos.

❖ A contração estimulada por nervos

- Os neurônios possuem axônios com ramificações que se estendem para fazer ligações funcionais, ou sinapses, nas fibras musculares.
- Um axônio é capaz de estimular várias fibras musculares.
- Em alguns animais vários axônios estimulam uma fibra apenas.
- Nos homens, cada fibra muscular possui apenas uma sinapse de uma das ramificações dos axônios.

❖ A contração estimulada por nervos

Quando um neurônio motor somático produz impulsos eletroquímicos, ele estimula a contração muscular seguindo esses passos:

1 – Assim que ele realiza uma sinapse, este libera um neurotransmissor conhecido como acetilcolina. Esta por sua vez estimula a fibra muscular a produzir seu próprio impulso eletroquímico.

2 – O impulso passa ao longo da membrana celular e são levados para dentro da fibra muscular por meio dos túbulos T.

3 – Os túbulos T levam esses impulsos até o retículo sarcoplasmático, que então libera os íons de cálcio (Ca^{2+}).

❖ A contração estimulada por nervos

Quando os impulsos eletroquímicos param:

- O neurônio para de liberar acetilcolina.
- A fibra muscular também para de produzir impulso, e os túbulos T não carregam mais impulsos.
- O retículo sarcoplasmático para de liberar íons cálcio.
- A troponina libera as actinas do filamento fino.
- E a tropomiosina retorna a sua posição inibitória, impossibilitando a formação das “cross-bridges”.

❖ A contração estimulada por nervos

Todo esse processo de estímulo, liberação, inibição, etc, onde o cálcio desempenha o papel mais importante é conhecido como associação de excitação- contração

❖ O recrutamento e as unidades motoras

- A resposta de uma fibra muscular a um estímulo ocorre de uma forma inteira ou sem resposta.
- O conjunto de fibras musculares inervadas por uma parte das ramificações de um axônio de um neurônio motor somático é definido como uma Unidade Motora.
- Quando ocorre um impulso por meio desse neurônio todas as fibras musculares ligadas à essa unidade contraem juntas.

❖ O recrutamento e as unidades motoras

- Maioria dos músculos possuem unidades motoras dos mais variados tamanhos que podem ser ativadas seletivamente.

Por exemplo: as menores contrações envolvem poucas unidades motoras, enquanto que à medida que exigem mais força pro movimento, mais unidades motoras são ativadas.

Esse exemplo é denominado como um recrutamento.

Unidade motora e seu respectivo axônio

❖ Reflexos das fibras musculares

Summation – Somatória das respostas musculares após estímulo seqüencial.

Tetanus - Contrações seqüenciais após estímulos de alta frequência sem tempo para recuperação.

Exemplificação da Summation e do Tetanus.

❖ Tipos de fibras musculares

❖ Tipo I – Vermelha (contração lenta)

- Menos mitocôndrias – respiração anaeróbica

❖ Tipo II – Branca (contração rápida)

- Mais mitocôndrias – respiração aeróbica

Diferentes concentrações de mioglobina – semelhante à hemoglobina.

❖ Metabolismo muscular durante descanso e exercício

- Fonte de energia para os músculos no descanso é de ácidos graxos.
- Durante exercício físico a glicose na célula e o glicogênio presente no sangue são as principais fontes de ATP.
- Para exercícios pesados, durante 45 a 90 segundos, o músculo respira anaeróbicamente para suprir a alta necessidade de energia.
- Para exercícios leves e moderados, durante 2 minutos, o músculo respira aeróbicamente para suprir a necessidade de energia.

❖ Fadiga muscular e treinamento físico

- Fadiga muscular está relacionada à incapacidade das fibras musculares gerarem força.
- Muitos dos casos estão relacionados à excessiva produção de ácido láctico pelos músculos durante respiração anaeróbica e também pela depleção de glicogênio nos músculos.
- Resistência muscular está diretamente relacionada com a capacidade de respiração aeróbica sustentada e a depleção de glicogênio nos músculos.
- Treinamentos longos não aumentam o tamanho dos músculos. Treinamentos rápidos, frequentes e intensos, como levantamento de pesos, podem produzir esse efeito, onde fibras musculares tipo II – brancas ficam mais grossas como resultado do aumento em número e tamanho das miofibrilas.

Modos de locomoção animal

Locomoção é a capacidade de se mover ativamente no espaço

- ❑ Mecanismos de propulsão e controle muscular
- ❑ Sistema nervoso coordena as contrações musculares

❖ Locomoção Animal

Locomoção apendicular

- Oscilações de membros
- Animais grandes

Locomoção Axial

- Ondulações corpóreas
- Pulsações
- Movimentos peristálticos

A *gravidade* e a *resistência friccional* são extremamente relevantes nos 3 ambientes:

- Aquático
- Terrestre
- Aéreo

❖ Locomoção na água

Formato do corpo relacionado com:

- resistência friccional
- turbulência gerada pelo movimento

Invertebrados marinhos:

- por propulsão hidráulica (ex: as Lulas)
- forma semelhante dos terrestres (organismos bentônicos)

Bivalves (scallops) executam rápido fechamento das valvas

❖ Locomoção na água

Enguias

- Ondulações **corpóreas** sinuosas
- Geradas por ondas de contrações musculares (axial direito e esquerdo)
- Fácil passagem das ondas, pois tem músculos entre cada uma das vértebras

As **baleias** geram ondulações verticais da cauda para se locomoverem

A estrutura óssea dos mamíferos não permite ondulações horizontais

Ilustração

Demonstração das forças atuantes nos movimentos aquáticos.

❖ Locomoção Terrestre

Divididos em 3 grandes grupos:

- Moluscos
- Artrópodes
- Vertebrados

❖ Locomoção Terrestre

Moluscos:

- Menos eficientes na locomoção

Com o auxílio do pé muscular e com o muco produzido, são capazes de deslizar sobre o ambiente terrestre.

Artrópodes e Vertebrados:

- Por possuírem membros desenvolvem rápidos meios de locomoção.
- Vertebrados: tetrápodes (4 membros)
- Artrópodes: 6 ou mais membros

Estabilidade X Velocidade

❖ Locomoção Terrestre

Tetrápodes:

- Locomoção apendicular
- Apêndices modificados como nadadeiras

Patras traseiras como apêndices Palmados:

- Sapos
- Tartarugas
- Aves como patos e gansos
- Maioria dos mamíferos marinhos

Figura ilustrativa de um salto de uma rã.

Exemplo de locomoção terrestre.

❖ Locomoção no Ar

- Propulsão do ar para baixo com auxílio das asas
 - vertebrados possuem asas convexas
- Pássaros e a maioria dos insetos possuem contrações alternadas dos músculos:

Extensores (subida) e **Flexores** (descida)

- Gerando frequência de 100 a 1000 batimentos por segundo!

Estes músculos estão conectados à quilha peitoral (externo) de forma que a contração de um distende o outro, gerando um efeito mecânico semelhante a roldanas, disparando contrações sem necessidade do impulso nervoso.

❖ Locomoção no Ar

Necessidades:

- Propulsão
- Centro de gravidade
- Suporte do corpo

Exemplo de propulsores:

- Gafanhotos
- Sapos
- Coelhos
- Cangurus

Cobras se movimentam por **impulsão** dos segmentos em contato com o chão e não por ondulações como as enguias!

Figura ilustrativa de diferentes modos de vôos.

Exemplo de locomoção no ar.

FIM

Muito obrigado pela atenção!!!